

## Palliative Schmerztherapie

### **Wann wird die Therapie angewendet?**

Schmerzlinderung bei fortgeschrittenem und ausgedehntem Tumorstadium durch „Direktbestrahlung“ der Metastasen im Knochen.

### **Wie können Sie sich als Patient vorbereiten?**

Wir benötigen im Voraus bei Ihrer Anmeldung aktuelles Labor (Blutbild, Kreatinin, nicht älter als 2 Wochen), sowie ein Skelettszintigramm (nicht älter als 3 Monate), erledigt in der Regel Ihr überweisender Arzt.

Ein nüchternes Erscheinen ist nicht notwendig.

### **Dauer der Behandlung:**

ca. 6 h

### **Ablauf der Behandlung:**

- Gespräch (Anamnese)
- Injektion des Radiopharmakons

### **Radiopharmakon / Applikationsform:**

37 MBq/kg KG Samarium-153 EDTMP / Injektion (Spritze)

### **Strahlenexposition:**

-

### **Nachsorge:**

Kontrolle des Blutbildes in 1 – 3 wöchigem Abstand bis 12 – 16 Wochen nach der Therapie beim überweisenden Arzt.

Eine weitere Therapie ist frühestens 3 Monate nach Ersttherapie möglich, wenn Blutbild- und Kreatininwerte in Ordnung sind.