

Präanalytik Exfoliativzytologie

Geltungsbereich:

Standort Kantonsspital Aarau AG: M_PAT_ALLE

Typ:

010_Checkliste

Revision:

1.0

Status:

Freigegeben

Freigegeben am:

24.11.2025 10:39

1. Abstriche

Oberflächenabstriche: z.B. Mundschleimhaut, Haut, Oesophagus, Mamille.

Reichlich Abstrichmaterial auf wenigen Objektträgern ausstreichen und sekundenschnell in Küvette mit Delaunay oder 96% Aethylalkohol fixieren, oder mit reichlich Fixations spray besprühen und bis zum Versand trocknen lassen.

2. Bürstenmaterial

Endoskopisch entnommenes Material aus Bronchien, Gastrointestinaltrakt, Harnwege.

Reichlich Abstrichmaterial auf wenigen Objektträgern ausstreichen und sekundenschnell in Küvette mit Delaunay oder 96% Aethylalkohol fixieren, oder mit reichlich Fixations spray besprühen und bis zum Versand trocknen lassen.

Oder: gesamtes Zellmaterial mit Bürste in 0,9% NaCl-Lösung sofort einsenden.

3. Ergusspunktate

Aszites, Pleura-, Perikardergüsse.

Möglichst grosse Ergussmenge (bis zu 2l) ohne jeden Zusatz unverzüglich überbringen lassen.

Ausserhalb unserer Betriebszeiten: Aufbewahrung im Kühlschrank (4-8°C) und am nächsten Arbeitstag sofort überbringen lassen.

4. Liquor cerebrospinalis

Angabe der Punktionsstelle: lumbal, ventrikulär oder shunt.

Gesamtmenge ohne jeden Zusatz zur sofortigen Verarbeitung unverzüglich überbringen lassen.

Ausserhalb unserer Betriebszeiten: Aufbewahrung im Kühlschrank (4-8°C), niemals tiefrieren und am nächsten Arbeitstag sofort überbringen lassen.

5. Spülflüssigkeiten und Sekrete

Ableitende Harnwege und Bronchialsystem.

Gesamtmenge ohne jeden Zusatz unverzüglich einsenden.

Ausserhalb unserer Betriebszeiten: Aufbewahrung im Kühlschrank (4-8°C) und am nächsten Arbeitstag sofort überbringen lassen.

Pneumocystis-Erreger: Bei Diagnose am selben Tag muss das Material bis um 15.30 im Zytologie-Labor eintreffen.

6. Urin

Zweiter Morgenurin (nach Diurese-Forcierung durch reichliche Flüssigkeitsaufnahme)

ohne jeden Zusatz. Bei längeren Transportwegen empfiehlt sich die Zugabe von 50% Aethylalkohol in gleicher Menge. Die gesamte Menge einsenden.

Der 1. Morgenurin und 24h-Sammelurin sind nicht geeignet (Zelldegeneration).

7. Sputum

Immer Morgensputum nach vorheriger Mundspülung sofort und ohne Zusätze einsenden.

Ausserhalb unserer Betriebszeiten: Aufbewahrung im Kühlschrank (4-8°C) und am nächsten Arbeitstag sofort überbringen lassen.

Evtl. wiederholte Einsendung von Morgensputa an drei aufeinanderfolgenden Tagen und Förderung der Zellablösung durch physiotherapeutische Massnahmen.

Titel:

Präanalytik Exfoliativzytologie

Revision:

1.0

ConSense Objekt Nr.:

34379500

CAVE: Ausdruck! Bitte neuste Revision in ConSense beachten!

Seite 1 / 1