

Impfzentrum KSA

COVID-19 Impfung

Wichtige Informationen



Kontraindikation für COVID-19 Impfung

- Fieber
 - Schwangerschaft
 - Schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie) gemäss Rücksprache mit Ihrem Hausarzt
- Bei Blutverdünnung (Antikoagulation) informieren Sie die Person, die Sie impft.

Kurzzeitige Nebenwirkungen der Impfung (gemäss Swissmedic)

- Schmerzen an Einstichstelle (>80%)
- Kopfschmerzen (>50%)
- Muskelschmerzen (>30%)
- Fieber (>10%)
- Müdigkeit (>60%)

Bei Fieber nach Impfung kann Paracetamol 500 mg maximal 4 x am Tag, oder Ibuprofen 400 mg maximal 3 x am Tag für einen Tag eingenommen werden. Bei anhaltendem Fieber oder anderen Beschwerden kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt, stellen sich in der Notfallpraxis vor, oder rufen Sie an unter **062 838 46 00**.

Bitte tragen Sie sich den 2. Impftermin in Ihrer Agenda ein. Erst 7 Tage nach der 2. Dosis erhalten Sie den vollen Schutz.